

Près de 25 % des cadavres présentent des caillots blancs et caoutchouteux, selon les embaumeurs.

BY RHODA WILSON ON 17 JUILLET 2026

Pendant quatre ans, de 2022 à 2025, le major à la retraite de l'US Air Force, Thomas Haviland, a mené une enquête. **embaumeurs** (<https://fr.expose-news.com/?s=embalmers>) sur l' **caillots de sang caoutchouteux** (<https://fr.expose-news.com/?s=rubbery+clots>) or **caillots fibreux blancs** (<https://fr.expose-news.com/?s=fibrous+clots>) que les embaumeurs, les pathologistes et d'autres avaient commencé à craindre peu après le déploiement des « vaccins » contre la COVID.


Les résultats de ces enquêtes, qui comprenaient les réponses de 808 embaumeurs de 5 pays, ont été publiés dans une revue médicale le 1er juillet.

75.2 % des personnes interrogées ont déclaré avoir observé des amas ou des structures fibreuses blanches inhabituelles dans les corps des défunts. Ces structures seraient présentes dans 23.4 % des corps embaumés.

Une étude pluriannuelle menée auprès de 808 embaumeurs dans 5 pays révèle la présence de caillots fibreux blancs inhabituels dans 75.2 % des cadavres.

By Nicolas Hulscher, MPH (<https://x.com/NicHulscher>), tel que publié par *Points focaux* (<https://www.thefocalpoints.com/>) sur 2 Juillet 2026

A une nouvelle étude évaluée par des pairs dans le (<https://ijrms.in/index.php/ijrms/article/view/2201>) *Revue internationale de recherche innovante en sciences médicales* (<https://ijrms.in/index.php/ijrms/article/view/2201>) (<https://ijrms.in/index.php/ijrms/article/view/2201>) a officiellement documenté un phénomène que les embaumeurs signalent depuis des années : des structures fibreuses blanches inhabituelles trouvées dans les veines et les artères des personnes décédées.



L'étude a été menée par Thomas F. Haviland, major retraité de l'US Air Force, mathématicien et analyste de données, en collaboration avec Laura Kasner et Daniel Santiago, docteur en pharmacie. Pendant quatre années consécutives, de 2022 à 2025, les chercheurs ont recueilli les réponses d'embaumeurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Au cours des quatre années d'enquête, 808 embaumeurs ont participé..

Lorsque les résultats pluriannuels sont combinés, 75.2 % des embaumeurs ont déclaré avoir observé des caillots fibreux blancs, et on estime que ces structures étaient présentes dans 23.4 % des cadavres embaumés au total.

D'après les personnes interrogées, ces structures sont généralement blanches ou blanc cassé, dures, caoutchouteuses et mesurent souvent de plusieurs centimètres à plus de 30 centimètres de long. De nombreux embaumeurs ont indiqué qu'elles obstruaient les vaisseaux sanguins, perturbaient le drainage et nuisaient à la distribution normale du fluide d'embaumement. Les praticiens expérimentés les ont décrites comme étant différentes des caillots classiques « en graisse de poulet » et « en gelée de groseille » fréquemment rencontrés lors de l'embaumement.

L'une des conclusions les plus marquantes concerne le calendrier. Dans l'enquête de 2022, les thanatopracteurs ont signalé une nette augmentation des premières observations à partir de 2020, qui s'est accélérée en 2021. Cette augmentation a coïncidé avec le déploiement mondial des campagnes de « vaccination » contre la COVID-19, au cours desquelles des milliards de doses ont été administrées dans le monde entier.

A deuxième papier (<https://ijirms.in/index.php/ijirms/article/view/2202>) L'étude publiée le même jour est allée au-delà des données d'enquête et a réalisé des analyses en laboratoire sur des échantillons représentatifs de ces structures fibreuses. Menée par Daniel Santiago, docteur en pharmacie, en collaboration avec Greg Harrison, Miklós Veres, Mark File et Dennis Planner, cette étude a utilisé la microspectroscopie Raman, la quantification des protéines et le profilage des acides aminés pour caractériser le matériau.






Figure 1: Samples S1-top and S2 bottom on the silicon wafer after drying. S1 appears light brown-yellow; S2 is dark brown.

Les chercheurs ont identifié des signatures protéiques marquées et ont conclu que ces structures semblent représenter des agrégats protéiques atypiques, distincts des thrombi post-mortem classiques. L'analyse spectroscopique suggère une progression d'un état natif en hélice α vers une configuration plus avancée, enrichie en feuillets β , ce qui est cohérent avec une agrégation protéique dépendante du stade.

En clair, les chercheurs ont découvert que ces structures ne sont pas de simples caillots sanguins. Elles semblent plutôt constituées d'agrégats protéiques anormaux qui s'organisent et se compactent progressivement. Cette maturation structurale progressive pourrait expliquer pourquoi les embaumeurs les décrivent souvent comme longues, élastiques, résistantes et difficiles à extraire.

Bien que l'étude ait mis en évidence une agrégation de protéines enrichie en feuillets β – l'une des caractéristiques communément associées à la formation d'amyloïdes – les auteurs ont souligné que des tests supplémentaires sont nécessaires avant que ces structures puissent être classées comme de véritables fibrilles amyloïdes.

Ces résultats sont particulièrement significatifs lorsqu'ils sont considérés en parallèle avec une étude antérieure publiée et évaluée par des pairs a révélé la présence de microcaillots amyloïdes chez 100 % des participants vaccinés. (<https://www.thefocalpoints.com/p/breaking-study-anomalous-amyloid>), y compris tous les sujets témoins sains vaccinés.



Dans cette étude, les microcaillots pathologiques ont été identifiés à l'aide de la thioflavine T, un colorant se liant à l'amyloïde, et il a été démontré que la protéine Spike purifiée induisait directement la formation d'agrégats amyloïdes insolubles et résistants à la fibrinolyse.

Ensemble, ces résultats soulèvent la possibilité que les agrégats amyloïdogènes microscopiques précédemment documentés dans le sang puissent représenter un stade antérieur du même processus pathologique d'agrégation protéique qui se manifeste finalement sous la forme de grands moulages fibreux blancs et caoutchouteux que les embaumeurs du monde entier signalent maintenant.

En résumé, c'est simple : des centaines d'embaumeurs dans plusieurs pays signalent le même phénomène inhabituel, et les premières analyses en laboratoire suggèrent que ces structures ne sont pas de simples caillots de sang post-mortem.

Il ne faut plus ignorer cela.

Articles connexes de *L'Exposé*:

- Une enquête menée auprès des embaumeurs révèle que beaucoup d'entre eux trouvent des caillots caoutchouteux ; « la science » ne couvrira jamais les histoires qui menacent les sponsors de Big Pharma
- Les caillots fibreux et caoutchouteux causés par les injections de Covid ont une activité d'ensemencement semblable à celle des prions
- Enquête mondiale auprès des embaumeurs : 250 embaumeurs signalent la présence de caillots blancs caoutchouteux
- 64 % des embaumeurs présents à une convention du Tennessee confirment avoir vu des caillots fibreux blancs cette année

À propos de l'auteur

Nicolas Hulscher (<https://x.com/NicHulscher>), titulaire d'une maîtrise en santé publique (« MSP »), est épidémiologiste et administratrice à l'Université de Californie à San Francisco. Fondation McCullough, (<https://x.com/McCulloughFund>) qui publie des articles sur une page Substack intitulée «Points focaux» (<https://www.thefocalpoints.com/>)".

Hulscher (<https://sciprofiles.com/profile/NicolasHulscher>) Il est connu pour ses recherches sur les effets indésirables de la vaccination contre la Covid-19, notamment sur la myocardite et autres séquelles post-aiguës. Il a été l'auteur principal de plusieurs études sur la vaccination contre la Covid-19 et a contribué à d'autres. Il a également co-écrit des recherches sur l'origine proximale du virus hautement pathogène de la grippe aviaire H5N1.

Image principale : Photographies représentatives des structures fibreuses blanches signalées (fournies par Richard Hirschman, embaumeur en Alabama). Ces images illustrent l'aspect macroscopique décrit par plusieurs embaumeurs. Adapté de : Observations rapportées par les embaumeurs de structures fibreuses blanches inhabituelles sur des cadavres embaumés : résultats d'une enquête pluriannuelle menée auprès d'embaumeurs dans cinq pays, 2022-2025 (<https://ijrms.in/index.php/ijrms/article/view/2201>)Revue internationale de recherche innovante en sciences médicales, 1er juillet 2026